<table>
<tr><td colspan="2">МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ГБУЗ РМ «Станция скорой медицинской помощи»</td><td colspan="2">СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА</td><td>НОМЕР: 3</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>ЛИСТ: 1

ВСЕГО: 6</td></tr>
<tr><td colspan="3">Название

Дезинфекция салона автомобиля скорой медицинской помощи</td><td colspan="2">ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:

главный фельдшер, старшие фельдшера</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ДЕЙСТВУЕТ С:

«01» сентября 2018 года</td><td>ЗАМЕНЯЕТ:

Вводится впервые</td><td rowspan="2">ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">СОСТАВИЛ:

Главный фельдшер Н.А. Каптилкина</td><td colspan="3">УТВЕРДИЛ:

Руководитель Д.Б. Якушев
«___»_____20__года</td></tr>
</table>

Цель:

Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима.

Область применения:

Где: автомобили СМП.

Когда: по требованию.

Ответственность:

Контроль: главный фельдшер, старшие фельдшеры.

Ответственные исполнители: фельдшеры и медицинские сестры.

Основная часть СОП

Общие сведения

Объем и характер дезинфекционных мероприятий, проводимых в салонах машин скорой помощи, зависит от назначения машины (доставка врача для оказания

медицинской помощи больному на дому или на месте происшествия, госпитализация соматических больных, рожениц, госпитализация инфекционных больных и т. д.).

В машинах скорой медицинской помощи, обслуживающих соматических неинфекционных больных, проводят **профилактическую дезинфекцию** в конце рабочей смены (2 раза в сутки).

Текущая дезинфекция необходима после каждого больного, перевезенного в ЛПУ (подголовники, носилки, кресла).

Заключительная дезинфекция осуществляется после перевозки **инфекционных** больных и при сильном загрязнении салона по режимам, рекомендованным для конкретной инфекции. **Обработку машины должны проводить сотрудники той больницы, куда доставлен пациент.**

В целях профилактики педикулеза после перевозки больных педикулезом используют препараты в аэрозольной упаковке («Карбозоль», «Меди-фокс-супер» и др.) в соответствии с инструкциями по их применению. После обработки и необходимой экспозиции салон автомобиля проветривают не менее 30 минут.

Для дезинфекции салона машин скорой помощи могут быть использованы кислородсодержащие, хлорсодержащие средства, катионные поверхностно-активные вещества и др. Нежелательно применение средств, содержащих альдегиды, надуксусную кислоту.

В случае загрязнения объектов кровью используемые для дезинфекции средства должны быть эффективны в отношении вируса, возбудителей парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции.

При выборе дезинфицирующего средства для обработки салона предпочтение следует отдать моюще-дезинфицирующим средствам, малоопасным при ингаляционном воздействии и не требующим применения особых мер предосторожности, кроме резиновых перчаток.

Обработку поверхностей салона санитарного автомобиля проводят ветошью или орошением путём распыления дезраствора, исходя из норм расхода на 1 $м^2$ обрабатываемой площади:

— при протирании 0,1 л раствора на 1 $м^2$;

— при орошении 0,2 л раствора на 1 $м^2$.

Время экспозиции – в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства.

Алгоритм выполнения:

Оснащение

- перчатки защитные;
- респиратор;
- фартук;
- чистая ветошь;
- емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства «Для обработки поверхностей и оборудования санитарного транспорта СМП»;
- емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства «Для замачивания ветоши»;
- емкость «Для сбора жидких выделений пациента»;
- средство для дезинфекции поверхностей салона;
- средство для обработки рук персонала (1–2 упаковки);
- средство для профилактики педикулеза;
- бактерицидный облучатель.

Емкости с растворами дезинфицирующего средства, ветошью, спецодеждой располагаются в специально отведенном месте в санитарном транспорте СМП.

Дезинфекции в санитарном транспорте скорой помощи подвергают поверхности в салоне (стены, пол, двери и т. д.), оборудование, поверхности приборов, аппаратов, носилки, подголовники.

Техника уборки

1. Перед проведением дезинфекции необходимо надеть фартук, защитные перчатки, респиратор.
2. Извлечь ветошь из емкости с надписью «чистая ветошь».
3. Погрузить в раствор дезинфицирующего средства в емкости «Для обработки поверхностей и оборудования санитарного транспорта СМП», отжать, обработать поверхность стен, оборудования, носилки и т. д., не оставляя необработанных поверхностей.
4. Во время обработки ветошь должна быть достаточно влажной, при необходимости провести повторное погружение в раствор дезинфицирующего средства.
5. Ветошь после обработки поместить в емкость «Для замачивания ветоши» на необходимое время, указанное в инструкции.
6. Извлечь ветошь из емкости с надписью «чистая ветошь».
7. Погрузить в раствор дезинфицирующего средства в емкости «Для обработки поверхностей и оборудования санитарного транспорта СМП», отжать, обработать пол, не оставляя необработанных поверхностей.
8. При необходимости провести повторное увлажнение ветоши.
9. Ветошь после обработки поместить в емкость «Для замачивания ветоши» на необходимое время, указанное в инструкции.
10. После дезинфекции необходимо провести обеззараживание воздуха при помощи бактерицидного облучателя в течение 30 минут.
11. Носилки и подголовники следует обрабатывать после каждого больного или пользоваться салфетками (простынями) однократного применения, которые после использования утилизируют.

12. При загрязнении салона или оборудования в нем выделениями (фекалии, моча, рвотные массы) или другими биологическими субстратами или загрязнении кровью места загрязнения подвергают обеззараживанию немедленно, методом протирания ветошью с применением дезинфицирующих средств, рекомендуемых для этих целей.

Сбор жидких выделений пациента

1. Жидкие выделения пациента собираются в специальные промаркированные емкости с последующей их дезинфекцией методом замачивания.
2. Извлечь емкость «Для сбора жидких выделений пациента», осуществить сбор в процессе выделения.
3. По возвращении на подстанцию СМП осуществить слив в систему канализации, емкость продезинфицировать методом протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, промыть под проточной водой, высушить и поместить в санитарный автотранспорт СМП.
4. Генеральная уборка автомобиля скорой медицинской помощи проводится один раз в неделю согласно графику, утвержденному на станции, силами бригады скорой медицинской помощи.

Нормативно-правовая документация

ГОСТ Р 56893-2016 «Стерилизация медицинской продукции».

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

«Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях».

Федеральные клинические рекомендации «Гигиена рук медицинского персонала».

МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

ГОСТ Р 51870-2014. Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия».

Инструкции по применению дезинфицирующих и моющих средств.

Распределение данной инструкции

Оригинал: главный фельдшер

Копии: старшие фельдшеры

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:

№	Фамилия	Подпись	Дата